

Dupla Salicum (2001)

Anton DRESCHER*

DRESCHER, A. 2001. Dupla Salicum (2001). – Fritschiana 27: 21–29. – ISSN 1024-0306

Zusammenfassung: Dupla Salicum (2001) umfaßt 20 Aufsammlungen aus Österreich, Italien und Frankreich. Das Material dieser Serie stammt von den Sammlern A. DRESCHER, J. KERNER (†) und J. POELT (†). Für biographische Hinweise zu Josef KERNER und Josef POELT siehe Fritschiana 27: 2. Die bemerkenswertesten Aufsammlungen der Dupla Salicum (2001) sind *Salix atrocinerea* aus Sardinien (Italien) und die historische Aufsammlung von *Salix purpurea* × *Salix viminalis* aus den Auen des damals noch verzweigten Wienflusses, der heute als Kanal im total verbauten Stadtgebiet liegt.

Abstract: Dupla Salicum (2001) contains 20 collections from Austria, Italy and France. Collectors of the material are A. DRESCHER, J. KERNER (†) and J. POELT (†). For biographical notes about Josef KERNER and Josef POELT, see Fritschiana 27: 2. The most remarkable collections of Dupla Salicum (2001) are *Salix atrocinerea* from Sardinia (Italy) and the historical collection of *Salix purpurea* × *Salix viminalis* from the braided reach of the Wienfluß, which is now a canal and part of the city of Vienna.

* Anton DRESCHER, Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz,
Holteigasse 6, A-8010 Graz, AUSTRIA.
e-mail: anton.drescher@uni-graz.at
homepage: <http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~drescher/index.htm>

Die Serie Dupla Salicum wurde zur Veröffentlichung und Verteilung von Dubletten hauptsächlich historischer Aufsammlungen gegründet. Da diese Dubletten in sehr unterschiedlicher Stückzahl vorliegen (3–20), werden auf jedem Etikett alle Herbarien genannt, die eine Dublette erhalten. Die dafür verwendeten Herbarabkürzungen folgen HOLMGREN P.K., HOLMGREN N.H. & BARNETT L.C. 1990: Index Herbariorum, Part I. The Herbaria of the World, Ed. 8. Regnum Vegetabile, Vol. 120. New York bzw. <http://www.nybg.org/bsci/ih/searchih.html>. Die Herbarien in Graz (GZU), Corvallis (OSC) und Beijing (PE) erhalten alle verteilten Kollektionen. Die Etiketten sind nicht numeriert, die Taxa alphabetisch geordnet.

Die ursprünglich handschriftlich (Kurrent) vorliegenden Etikettentexte der historischen Aufsammlungen wurden nach Möglichkeit unverändert übernommen und durch zusätzliche Angaben in eckigen Klammern, wie z. B. die Entfernung zu größeren Ortschaften in der Umgebung sowie die geographische Breite und Länge, ergänzt. Die geographische Länge wird E bzw. W von Greenwich angegeben. Für eine bessere Information über die ökologischen Ansprüche einer Art werden für einige der rezenten Aufsammlungen Standortangaben und Begleitarten oder eine pflanzensoziologische Aufnahme (BRAUN-BLANQUET 1964) beigefügt.

Dupla Salicum (2001) ist auch unter dem URL: <http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~drescher/dupl-salicum.html> zu finden.

Dupla Salicum was established as a series for the publication and distribution of mainly historical collections with irregular numbers of 3–20 duplicates. Therefore the institutions receiving a duplicate of a collection are cited in the bottom line of each individual label with their international herbarium abbreviations (HOLMGREN P.K., HOLMGREN N.H. & BARNETT L.C. 1990: Index Herbariorum, Part I. The Herbaria of the World, Ed. 8. Regnum Vegetabile, Vol. 120. New York or <http://www.nybg.org/bsci/ih/searchih.html>). The herbaria in Graz (GZU), Corvallis (OSC) and Beijing (PE) receive all distributed collections. The collections of this series are not numbered, the taxa are sorted alphabetically.

For the historical collections, the text of the original handwritten labels is left more or less unchanged, using the vernacular names of localities. Additional data, e.g., the distance to the nearest town and geographical latitude and longitude, are inserted in square brackets. Geographical longitude is given E or W of Greenwich, respectively. For some of the recent collections, geomorphological features and a list of accompanying species or a phytosociological relevée (BRAUN-BLANQUET 1964) are added.

Dupla Salicum (2001) is kept as a text version under: <http://www-ang.kfunigraz.ac.at/~drescher/dupl-salicum.html>.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix appendiculata Vill., Hist. Pl. Dauph. 3(2): 775 (1789)

Syn: *S. grandifolia* Ser.

ÖSTERREICH, Steiermark: Nördliche Kalkalpen, Dachstein Massiv, Kemetgebirge, Gebiet der Plankenalm, ca. 250 m Luftlinie NW der ‚Unteren Hüttstatt‘; 47°29'25"N/13°46'10"E; 1750 m.

Durch eine hohe Felswand beschattete Kalkfelsen

30. Juli 1998

leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, LJU, OSC, PE, UBC.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix atrocinerea Brot., Fl. Lusit. 1: 31 (1804)

ITALIEN, Sardinien, Prov. Núoro: Barbágia Seúlo; Mte. Arcueri [ca. 16 km Luftlinie SE Lanusei; 39°50'59"N/9°30'17"E], Felsabbrüche über der Straße zur Genna e Medan ober der Cant. Arcueri; ca. 950–1080 m.

Kalkfelsabbrüche mit Rasen und Steineichenwaldresten.

3. Mai 1986

leg. J. Poelt, det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, JACA, MA, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix caprea L., Sp. Pl. 1021 (1753) E

ÖSTERREICH, Steiermark, Oststeirisches Hügelland: ca. 9,5 km Luftlinie E Graz, Reindlwald, auf dem Rücken zwischen Hollergraben und Greithgraben; 47°07'00"N/15°32'35"E; 575 m.

Am Rande von *Fagus sylvatica-Quercus petraea-Pinus sylvestris*-Beständen.

Kart. der Flora Mitteleuropas, Quadr.-Nr. 8859/3

1. April 1998 leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: BKF, CLF, GZU, JACA, KRA, LG, LJU, MA, NY, OSC, PE, R, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix cinerea L., Sp. Pl. 1021 (1753) Γ

ÖSTERREICH, Steiermark: Südöstliches Alpenvorland, östliche Umgebung von Graz, KG Purgstall, Ursprung des Greithbaches, ca. 300 m E des Gehöfts vulgo Grubbauer; 47°07'10"N/15°33'12"E; 460 m.

Feuchtwiesen am Rande der Talmulde.

8. März 1998 leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: BKF, CLF, GZU, JACA, KRA, LG, LJU, MA, NY, OSC, PE, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix elaeagnos Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 257 (1772) E

Syn.: *Salix incana* Schrank

ÖSTERREICH, Oberösterreich: [Alpenvorland,] Wels (Katzengraben bei Thalheim); [48°09'N/14°02'E; 360–380 m].

[ohne Sammeldatum, 2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, LJU, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix elaeagnos Scop. × **Salix caprea** L. Γ

ÖSTERREICH, Oberösterreich: [Alpenvorland,] Wels, (Katzengraben bei Thalheim); [48°09'N/14°02'E; 360–380 m].

[ohne Sammeldatum, 2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, JACA, LG, LJU, OSC, PE, UBC.

Annot.: Dieser Bastard ist lokal mehrmals entstanden, da von J. Kerner Belegmaterial sowohl von Γ als auch von E Bastarden auch aus den benachbarten N-exponierten Abhängen zur Donau ("Traunleiten") vorliegt. Der binäre Name '*Salix seringeanae*' Gaudin ist dubios und wird daher hier nicht verwendet.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix glabra Scop., Fl. Carn. ed. 2, 2: 255 (1772) E

ÖSTERREICH, Salzburg: [Nördliche Kalkalpen, Salzburger Kalkalpen] auf dem Nockstein [5,2 km Luftlinie E der Stadt Salzburg; 47°00'N/13°07'E].

Mai 1891 leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, LJU, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix hastata L., Sp. Pl. ed. 1017 (1753) E

ÖSTERREICH, Salzburg: Radstädter Tauern (Obertauern) [47°15'N/13°33'30"E; 1750–1880 m].

1. Juli 1897 leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: BKF, CLF, GZU, JACA, LG, LJU, MA, OSC, PE, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix helvetica Vill., Hist. Pl. Dauph. **3(2): 783 (1789) E**

ÖSTERREICH, Tirol: Stubai Thal; [47°03'–11°N/11°14'–23'E].

ohne Sammeldatum [2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix mielichhoferi Sauter, Flora (Regensburg) **32: 662 (1849)**

ÖSTERREICH, Salzburg: Radstädter Tauern, (an der Taurach oberhalb des Tauernhauses „Wiesenegg“; [47°15'N/13°32'20"E; 1750–1850].

16. Juli 1893 leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, JACA, LG, LJU, OSC, PE, UBC.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix myrsinifolia Salisb., Prodr. 394 (1796)

Syn: *Salix nigricans* Sm.

ÖSTERREICH, Niederösterreich: zwischen Hohenberg und St. Aegydt [am Neuwalde] V.O.W.W. [Viertel ober dem Wiener Wald], [47°51'–54'N/15°35'E; 500–600].

September 1860 leg. & det. J. Kerner, rev. A. Drescher

Annot.: Die hier im vorliegenden Belege sind Langtriebe und damit in Bezug auf Größe und Blattform untypisch.

Verteilt an / distr. to: GZU, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix pentandra L., Sp. Pl. 1016 (1753)

FRANKREICH, Département Puy-de-Dôme: Massif Central, Parc régional des Volcans d'Auvergne, Monts du Cézallier, ca 800 m W des Dorfes Parrot; 45°21'10"N/2°59'30"E; ca. 1310 m.

N-Exponierte Unterhänge des le Luguët zum Quelllauf des Combavière; Unterbrochener Weidengebüschsaum.

16. Juli 1893 leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix purpurea L. × **Salix viminalis** L. E

(*Salix* × *rubra* Huds.)

ÖSTERREICH, Niederösterreich: Penzing (Au am Wienfluß); [48°11'25"N/16°18'E; ca. 190 m].

[ohne Sammeldatum, 2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Annot.: Diese Auegebiete sind heute dicht verbautes Wiener Stadtgebiet, der Wienfluß zur Gänze in eine Betonrinne gezwängt.

Dieser Bastard, der nicht nur lokal häufig auftritt, ist im Gebiet mehrmals entstanden, da von J. Kerner Belegmaterial sowohl von ♂ als auch von ♀ Individuen aus der Aue des Wienflusses zwischen Schönbrunn und Hütteldorf aus den Jahren 1859–1864 vorliegt.

Verteilt an / distributed to: BKF, CLF, GZU, JACA, KRA, LG, LJU, MA, NY, OSC, PE, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix retusa L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1287 (1759) E

ÖSTERREICH, Steiermark: Nördliche Kalkalpen, Dachstein Massiv, Kemetgebirge, Gebiet der Plankenalm, ‚Bärfalleben‘, ca. 1 km Luftlinie NE des Gipfels des ‚Großen Hocheck‘; 47°29'38"N/13°45'45"E; 1790 m.

Kalkfelsblöcke am Rande einer Almfläche

29. Juli 1998 leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, JACA, LG, LJU, MA, OSC, PE, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) subsp. **discolor**
(Koch) Arcangeli, Comp. Fl. Ital 626 (1882) Γ

Syn: *S. triandra* L. subsp. *amygdalina* (L.) Schübl. & Martens

ÖSTERREICH, Oberösterreich: Wels (Au im Aschet); [ca. 140 m].

1865 leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) subsp. **triandra**

Syn: *S. amygdalina* var. *concolor* Koch; *S. triandra* L. subsp. *concolor* (Koch)
Neumann ex Rech. fil.

ÖSTERREICH, Niederösterreich: Marchfeld, Marchauen bei Marchegg,
„Hechtensee“ NW des Jagdschlusses; 48°17'13"N/16°53'55"E; 140 m.

Buschweidensaum entlang des Altarmes.

18. August 1996 leg. & det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: BKF, CLF, GZU, JACA, KRA, LG, LJU, MA, NY, OSC, PE, R, UBC, US.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) subsp. **triandra** E

Syn: *S. amygdalina* var. *concolor* Koch; *S. triandra* L. subsp. *concolor* (Koch)
Neumann ex Rech. fil.

ÖSTERREICH, Oberösterreich: Wels, (in der sogenannten Schütt); [140 m].

ohne Sammeldatum [2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Annot.: Als ‚Schütt‘ wurden Inseln zwischen den Armen des nicht regulierten Flusses bezeichnet, die nach jedem Hochwasser ihre Größe und Gestalt veränderten. Die Standorte sind heute durch die Regulierung der Traun vernichtet.

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix triandra L., Sp. Pl. 1016 (1753) subsp. **triandra** Γ

Syn: *S. amygdalina* var. *concolor* Koch; *S. triandra* L. subsp. *concolor* (Koch)
Neumann ex Rech. fil.

ÖSTERREICH, Oberösterreich: Wels, (in der sogenannten Schütt); [140 m].

ohne Sammeldatum [2. Hälfte des 19. Jh.] leg. & det. J. Kerner

Annot.: Als ‚Schütt‘ wurden Inseln zwischen den Armen des nicht regulierten Flusses bezeichnet, die nach jedem Hochwasser ihre Größe und Gestalt veränderten. Die Standorte sind heute durch die Regulierung der Traun vernichtet.

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix viminalis L., Sp. Pl. 1021 (1753) E

ÖSTERREICH, Niederösterreich: [Wachau, Donautal am orographisch
rechten Donauufer S Krems] Mautern; [48°23'N/15°34'E; ca. 200 m].

ohne Sammeldatum [2. Hälfte des 19. Jh.] leg. J. Kerner, det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, OSC, PE.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix viminalis L., Sp. Pl. 1021 (1753) Γ

ÖSTERREICH, Niederösterreich: [Wachau, Donautal am orographisch
rechten Donauufer S Krems] Mautern; [48°23'N/15°34'E; ca. 200 m].

ohne Sammeldatum [2. Hälfte des 19. Jh.] leg. J. Kerner, det. A. Drescher

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, LJU, OSC, PE, UBC.

Drescher A. 2001: **Dupla Salicum (2001)**. – Fritschiana 27: 21–29.
Herausgegeben am Institut für Botanik, Karl-Franzens-Universität Graz (GZU)

Salix waldsteiniana Willd., Sp. Pl. **4(2)**: 679 (1806) E

ÖSTERREICH, Tirol: [Nordtiroler Kalkalpen, Karwendel Gebirge, S-Abhänge der Nordkette,] Seegrube unter der „Frau Hütt“, bei Innsbruck; [47°18'30"N/11°23'E; 1960–2000 m].

18. 07. 1861

leg. & det. J. Kerner

Verteilt an / distributed to: GZU, LG, LJU, OSC, PE, UBC.

