Hasel (*Corylus avellana*)

Birke (*Betula pendula*)

Ambrosie (*Ambrosia artemisifolia*)

Hasel (*Corylus avellana*)

Institution und Erreichbarkeit

Institut für Pflanzenwissenschaften
Holteigasse 6,
8010 Graz

Mag. Dr. Ursula Brosch
T: +43 (0)316 380 - 5662
F: +43 (0)316 380 - 9883
E: ursula.brosch@uni-graz.at

Mag. Pramodchandra Harvey
T: +43 (0)316 380 - 8833
F: +43 (0)316 380 - 9883
E: pramod.harvey@uni-graz.at

W: pollen-monitoring.uni-graz.at

Für Newsletter-Abo einfach eine Email an uns schicken!



„DIE POLLEN“ SIND LOS!

PWD Steiermark

Pollenwarndienst
für
die Steiermark

Worum geht es?

Die Aufgabe des Pollenwarndienstes für die Steiermark ist es, aktuelle Informationen über Pollenflugbeginn und -dauer allergierelevanter Pflanzen sowie über die täglichen bzw. wöchentlichen Pollenmaximal-belastungen zu geben. Pollenflug-Vorhersagen sind für ÄrztInnen und PollenallergikerInnen ein wichtiges Hilfsmittel.

In der Steiermark werden seit 1982 Untersuchungen des Pollenfluges vorgenommen. Seit 1993 wird der Pollenwarndienst im Auftrag der Steiermärkischen Landesregierung durchgeführt und subventioniert.
Messungen des Pollenfluges als Grundlage für die aktuelle Vorhersage sind seit Jahrzehnten mit der international standardisierten BURKARD-Pollenfalle möglich.

Aufgrund langjähriger Beobachtungen und Erfahrungen, verbunden mit meteorologischen Daten und Kenntnissen von Blühverhalten und Blührhythmen, sind unsere Pollenflug-Prognosen gültig für den Großraum Graz sowie die Regionen (Süd-) Oststeiermark bzw. den östlichen Anteil der Obersteiermark.

BURKARD-Pollenfalle im Botanischen Garten

Ein Pollenkalender für Graz

Ein Pollenflugkalender stellt in graphischer Form eine Übersicht über das jahreszeitliche und quantitative Auftreten des Pollenfluges in einer bestimmten Region dar. Er bietet eine optisch leicht erfassbare Übersicht, wann der Pollenflug von allergologisch relevanten Pollentypen möglich ist. Die Einstufung in die Konzentrationsklassen „gering, mittel, hoch“ ist natürlich vom Pollentyp und dessen spezifischer, freigesetzter Pollenmenge abhängig. Sie entspricht aber nicht dem Einsetzen oder der Intensität allergischer Beschwerden.