

Wirtschaftsmathematik - Übungen SS 2026

Blatt 2: Mathematische Grundlagen

1. Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke:

$$\text{a) } \frac{(2x^{3-2n} \cdot y)^2}{(4x^{2n})^3} : \frac{(x^{n+2})^2}{8x^{12n}} =$$

$$\text{b) } \frac{3x^{-\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{x^5}}{\sqrt{9x}} =$$

2. **P 10** Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke, soweit möglich:

$$\text{a) } \frac{2^3 \cdot c^{-1} \cdot c^2}{(cd)^{-2}} \cdot \left(\frac{d^{-1}}{4^{-1}d^{-2}c} \right)^{-1} - \frac{4cd}{3} = \quad \text{b) } \frac{\sqrt[3]{a^4b^{-2}}}{\sqrt{a^{-1}b^3}} \cdot \left(a^{\frac{1}{2}}b^{-\frac{1}{3}} \right)^3 =$$

3. Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke:

$$\text{a) } \frac{5!}{2!3!}$$

$$\text{b) } \frac{(n-1)!}{(n-3)!}$$

4. **P 11** Vereinfachen Sie, soweit möglich:

$$\text{a) } \frac{(m+1)!}{(m+1) \cdot m!} = \quad \text{b) } \frac{(2n)!}{(2n-2)!} =$$

5. Berechnen Sie:

$$\frac{1}{3} \cdot \sum_{i=1}^3 (3i-1)^2 - 25 =$$

6. Berechnen Sie die folgende Doppelsumme:

$$\sum_{k=1}^2 \sum_{i=10}^{13} \frac{i+1}{k}$$

7. **P 12** Berechnen bzw. vereinfachen Sie die folgende Doppelsumme, soweit möglich:

$$\frac{5! \cdot 3!}{4!} \cdot \sum_{n=1}^2 \sum_{k=2}^5 \frac{(-1)^k}{5} \cdot \frac{n}{k+1}$$

8. Bestimmen Sie jeweils die Definitionsmenge der folgenden Gleichungen, lösen Sie die Gleichungen nach der Variablen x auf, und geben Sie die Lösungsmenge an:

a) $\sqrt{x-1} - \sqrt{x-4} = 1$

b) $2 \cdot 5^x = 3^{x+4}$

c) $\frac{1}{3} = 3 \cdot e^{-0,2 \cdot x}$

d) $2 \cdot \log_{10}(x-2) - \log_{10}(x) = 0$

e) $(x^3 - 8) \cdot \sqrt{x-3} = 0$

9. **P 13** Bestimmen Sie die größtmögliche Definitionsmenge $D \subset \mathbb{R}$ der folgenden Gleichung und geben Sie die Lösungsmenge an:

$$\frac{17}{x^2 - 4} = \frac{3x - 3}{x - 2} - \frac{2x + 7}{x + 2}$$

10. **P 14** Lösen Sie die Gleichungen nach der Variablen x auf, und geben Sie die Lösungsmenge an:

a) $\frac{\sqrt{2^{3x}}}{3} = 5^{x-1}$

b) $2 \cdot \ln(x+5) = \ln(x^2 + 3x - 1)$

11. Lösen Sie die folgenden Ungleichungen und geben Sie jeweils die Lösungsmenge über \mathbb{R} an:

a) $\left| \frac{1}{2}x - 2 \right| \leq x + 1$

b) $\frac{3x+1}{x+1} < 2$

c) $\frac{2x^2+x}{x^2+1} < 2$

d) $2x^2 + 2x > 4$

e) $4x^2 \leq 16$

12. **P 15** Bestimmen Sie die größtmögliche Definitionsmenge $D \subset \mathbb{R}$ und lösen Sie die folgende Betragsungleichung in \mathbb{R} :

$$\frac{4x}{|x-1|} \leq 2$$

13. **P 16** Bestimmen Sie die größtmögliche Definitionsmenge $D \subset \mathbb{R}$ und geben Sie die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung über \mathbb{R} an:

$$\frac{5x-2}{x-4} > 1$$

14. P 17 Geben Sie die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung über \mathbb{R} an:

$$\frac{x-2}{3} < x^2 - \frac{4}{3}$$

15. Skizzieren Sie ein Venn-Diagramm mit zwei Mengen – beide Teilmengen einer Grundmenge G – *im allgemeinsten Fall*, und kennzeichnen Sie folgende Menge:

$$(\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$$

16. Die Menge $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, x, y, z, d, e\}$ hat die Teilmengen $A = \{1, 3, x, d\}$, $B = \{2, 4, x, d\}$ und $C = \{3, x, y, d, e\}$. Erstellen Sie ein Venn-Diagramm und bestimmen Sie die folgenden Mengen:

a) $A \cap B$

b) $A \cup C$

c) $A \setminus C$

d) \bar{C}

e) $A \Delta C$

f) $(\bar{A} \cup B) \setminus B$

17. P 18 Gegeben sind die Mengen

$$A = \{2, 5\}, \quad B =]-2; 5] \cap \mathbb{Z}$$

- a) Bestimmen Sie $A \Delta B$ sowie $A \setminus B$.
- b) Bestimmen Sie die Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$ der Menge A .
- c) Bestimmen Sie die Komplementmenge \bar{A} der Menge A bezüglich der Menge B , und geben Sie $|\bar{A}|$ an.
18. Bei einer Umfrage wurden 650 Studierenden danach gefragt, ob sie regelmäßig die Zeitung A, B oder C lesen. Die Auswertung ergab, dass 303 Studierende die Zeitung A lesen, 252 davon nur A; 90 Studierende lesen nur die Zeitung B; 5 Studierende lesen die Zeitung B und C; 14 Studierende lesen die Zeitung A und die Zeitung B, nicht aber Zeitung C; 35 Studierende lesen die Zeitung A und die Zeitung C, nicht aber Zeitung B; 195 Studierende lesen keine dieser drei Zeitungen.
- Erstellen Sie ein Venn-Diagramm des Sachverhalts und bestimmen Sie die Anzahl der Studierenden, die alle drei Zeitungen lesen und die Anzahl der Studierenden, die nur C lesen.

19. **P 19** Eine Umfrage zu Sportaktivitäten unter 150 Personen hat folgende Ergebnisse geliefert:

- 60 Personen besuchen regelmäßig ein Fitnessstudio, 50 spielen Tennis und 55 gehen regelmäßig joggen.
 - 10 Personen besuchen nur ein Fitnessstudio.
 - 20 Personen gehen sowohl joggen als auch ins Fitnessstudio.
 - 15 Personen spielen Tennis und gehen joggen.
 - 35 Personen spielen Tennis und gehen ins Fitnessstudio.
- a) Wie viele Personen betreiben alle drei Aktivitäten?
b) Wie viele Personen betreiben genau eine der drei Aktivitäten?
c) Veranschaulichen Sie Ihre Lösung mit einem Venn-Diagramm.

20. Gegeben sind die folgenden Mengen:

$$M_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 6\} \quad M_2 = \{0, 3\} \quad M_3 = [1; 4]$$

- a) Skizzieren Sie diese Mengen auf je einer Zahlengeraden der reellen Zahlen
- b) Bestimmen Sie den Durchschnitt $\bigcap_{i=1}^3 M_i$ aller drei Mengen.
- c) Bestimmen Sie die Vereinigung $\bigcup_{i=1}^3 M_i$ aller drei Mengen.
- d) Bestimmen Sie die Komplementmenge von M_1 bezüglich \mathbb{R} .
- e) Bestimmen Sie die symmetrische Differenz von M_1 und M_3 .
- f) Geben Sie die Potenzmenge der Menge M_2 an und bestimmen Sie $|M_2|$ sowie $|\mathcal{P}(M_2)|$.

21. Gegeben sind die folgenden Mengen:

$$A = \{2, 4\} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^3 < 64\}$$

Bestimmen Sie das kartesische Produkt $A \times B$ und skizzieren Sie diese Menge in einem geeigneten Koordinatensystem.

22. Skizzieren Sie die folgende Menge in $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Ist diese Menge konvex? (Hinweis: Eine Menge heißt konvex, wenn sie zu je zwei beliebigen Punkten auch deren ganze Verbindungsstrecke enthält.)

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 + (y + 2)^2 \leq 9 \wedge x \geq 0 \wedge y > 0\}$$

23. Gegeben sind die folgenden Mengen:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 2 \wedge |y| \leq 2\}$$

$$B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < \frac{1}{4}x^2 + 1 \right\}$$


Kennzeichnen Sie die Menge $A \cap B$ in einem geeigneten Koordinatensystem. Ist diese Menge konvex?

24. P 20 Gegeben sind die Mengen A und B , die wie folgt definiert sind:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (x + 1)^2 + (y - 2)^2 \leq 9\}$$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y \leq x + 1 \wedge y > 1\}$$

- a) Skizzieren Sie die Menge $A \cap B$ in einem geeigneten Koordinatensystem. Ist diese Menge konvex?
- b) Eine Menge $M \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ist in nachfolgender Abbildung grau unterlegt dargestellt:



Geben Sie die Menge in beschreibender Form an.

Die mit P gekennzeichneten Beispiele sind von den Studierenden vorzubereiten und nach Aufruf durch die Lehrveranstaltungsleitung zu präsentieren!